



【 使用耳用製劑的步驟 】

1. 將手徹底洗淨。
2. 避免讓滴管碰觸到耳朵或體表其他部位，以免造成污染。可以請他人幫忙滴藥。
3. 如果藥液是剛從冷藏處取出時，可握在手心幾分鐘，使藥液回復接近體溫的溫度，以免對耳朵造成太大的刺激。
4. 若藥液是懸浮液劑型，使用前應搖晃十秒左右使其均勻。
5. 側躺或將須滴藥之耳朵傾斜向上以方便滴藥。成人及兩歲以上兒童應將欲滴藥之耳朵向後上方拉，兩歲以下兒童則應將耳朵向後下方拉。
6. 將適量藥水滴入耳中，並如上述方向輕拉耳朵使藥水進入耳內。不要將滴管伸入耳中。
7. 滴完藥後，可保持耳朵傾斜約 2 分鐘，或塞入浸了藥液的棉花球(不要用乾棉花球，以免將滴入之藥液吸走)，但以醫生建議之方法為優先。
8. 滴完立刻旋緊滴管或將藥品滴管蓋回。洗淨雙手並安置藥品。
9. 給藥後耳道會癢或有燒灼感且病情無起色，要立刻讓醫師知道。

耳用製劑 Otozambon、Mycomb、Tarivid

此用藥指導卡並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。