【 眼藥水及眼藥膏的使用 】

一、一般使用：

1. 將手徹底洗淨，有戴隱形眼鏡者應先將鏡片取下，在點藥後 15 分鐘才可重新配戴。
2. 若藥水為懸浮液，應先充分搖勻。
3. 滴藥後輕閉眼一至二分鐘，並輕輕轉動眼球，可用手指輕壓鼻樑處(眼角內側)，以避免藥液漏出至鼻淚管而降低藥效。
4. 兩種以上眼藥水需間隔 5 分鐘，如醫師無特別囑咐，何種眼藥水先使用皆可。
5. 若有眼藥水及眼藥膏，先藥水後藥膏(藥水、藥膏間隔 5 分鐘)。
6. 眼用藥劑開封後，超過四個星期請勿再使用。

二、特殊注意事項：

◎ Atropine 眼藥水為治療近視用藥，因為使用此藥的病人可能會有畏光的現象，一般為睡前使用。第一次使用時可能會有視力模糊的不適感，須經 3 天左右的適應期。

◎ Xalatan(舒而坦眼藥水) 未開封前需置於冰箱冷藏(攝氏 2 到 8 度)。

◎ Kary uni (柯寧優尼點眼懸液) 每次使用前請振搖。

◎ Restasis(麗眼達眼用乳劑) 為單次使用包裝，當次點完即丟棄。

此用藥指導卡並未包含本藥所有的藥品資訊，若您仍有其他相關問題，請詢問您的醫師或藥師。

永和耕莘醫院病患用藥教育彙編 7th, 2018，藥劑科印製，藥品諮詢專線：(02)6620-6000