

檢驗項目：CA 72-4 / CA 72-4 腫瘤標記

健保編號：無

院內檢驗 委外代檢

檢體採檢：血清、血漿(Lithium heparin, K2-EDTA and K3-EDTA)1.0 mL

採檢容器：生化管/EDTA 管/Heparin 管

報告時效：每天

參考區間：< 6.9 U/mL

危險值：無

臨床意義：

腫瘤相關醣蛋白-72，為人類乳癌轉移的細胞膜抗原，其中有重複的寡糖結構稱為 CA 72-4。

CA 72-4 在很多種表皮細胞的惡性腫瘤都可出現，包括大腸、直腸、胃、胰臟、卵巢、和乳房，因為它反映疾病的嚴重性，所以主要目的是在手術後偵測治療效果。

上升於 59% 胃癌，32% 大腸癌，40% 大腸直腸癌，14% 肝細胞癌，52% 膽囊癌，22% 胰臟癌，21% 乳癌，23% 子宮癌，50% 卵巢癌，5% 大腸直腸息肉，9% 良性甲狀腺疾病，10% 心臟血管疾病，11% 胃腸發炎，8% 膽結石，8% 胰臟炎，文獻提到膽道阻塞者有 60% 上升，與月經週期可能有關係的腫瘤標記有 CA125、CA19-9、CA72-4，都是在月經初始時，可能上升三倍。

補單、複檢時效：無

影響檢驗結果的原因：溶血 3+

是否需患簽署同意書：否

注意事項：